

ORCHIDACÉES NOUVELLES D'INDOCHINE (suite)<sup>1</sup>.

Par F. GAGNEPAIN.

**Dendrobium perulatum** Gagnep., n. sp.

Caules  $\pm$  fusiformes vel clavati, majores subcylindracei, usque 30 cm. longi; vaginae mox fibrosae; articuli 10-12, teretes. Folia lanceolata, basi angustata, apice acuminata, in sicco striato-nervosa, usque 10 cm. longa, 2 cm. et ultra lata. Inflorescentiae breves, laterales ad caules aphylli enatae approximatae, pauciflorae, ex perula bracteosa ortae, bracteis hyalinis, mox evanidis, 15 mm. longis, floribus 2-3 in unaquaque, 4-5 cm. diam. — Sepalum posticum oblongum 22 mm. longum, breviter cuspidatum; sep. lateralia, angustiora 25 mm. longa, 5-6 mm. lata, subrecta, basi ad mentum brevem vix producta. Petala ambitu elliptica subobtusata 25 mm. longa, 11-12 mm. lata. Labellum breviter unguiculatum, lobis lateralibus subinconspicuis, explicatum 25 mm. longum latumque. Columna 4 mm. longa, operculo galeato, apice squamuloso furfuraceo, in mentum obtusum, 4 mm. longum basi anticeque producta.

Annam : canton de Laouan, délégation de Djiring, prov. Haut-Donnai, n° 22581, POILANE.

Le collecteur ajoute ce renseignement : fleurs blanches, le grand pétale central (labelle) a toute la base et la partie centrale jaunée foncée.

Cette espèce a beaucoup d'affinité avec *D. heterocarpum* Wall. Elle s'en distingue : 1° par les inflorescences issues d'une pérule à bractées inégales, les intérieures plus longues, atteignant 2 cm., scarieuses ; 2° le labelle étalé orbiculaire dans l'ensemble, à peine mucroné, non acuminé au sommet ni récurvé.

On dit que *D. heterocarpum* est odorant à la manière d'un *Primula officinalis*. POILANE affirme que la fleur n'est que peu ou non odorante.

Le *D. perulatum* a des affinités, aussi avec *D. Bensoniae* Rchb. et *gratiosissimum* Rchb. sans être ni l'un ni l'autre.

**Dendrobium sessile** Gagnep., n. sp.

Caules coespitosi, graciles, 20-35 cm. longi, cylindracei, rufo-hirtelli, 2-3 mm. crassi, articulati, articulis  $\pm$  2 cm. longis. Folia lanceolato-linearita, basi angustata apice acuminata, acuta, infra pilosa, usque 6 cm. longa, 7-8 mm. lata, numerosa. Inflorescentiae cymosae, subapicales, pauciflorae,

1. Cf. Bull. Mus., XXI, 1949, p. 737.

*molliter pilosae, 15-20 mm. longae, bracteosae, bracteis circiter 3, ovato-acuminatis, 7-5 mm. longis, hirtellis, 1-floris, floribus totidem, albidis sessilibus, pedicello certissime nullo, perianthio circiter 12 mm. longo, albido. — Sepalum posticum lanceolatum, breviter acuminatum 8 mm. longum, 4 latum, extus hirtellum; sep. lateralia 8 mm. longa, triangulo-acuminata, 3 mm. lata, basi longe producta coalitaque calcar efformantia, calcare obtuso, sacciforme, 2.5 mm. longo. Petala oblanceolata, linearia, 8 mm. longa, infra apicem 1.8 mm. lata, dorso pilosa. Labellum obverse cuneatum, 1.3 mm. longum integrum, longe unguiculatum, canaliculatum, apice 4 mm. latum dilatatum suborbiculare. Gynostemum breve, 4 mm. longum, apice tricuspidatum operculo ignoto. Ovarium sessile, obovatum, vel late fusiforme, 10 mm. longum, hirtellum.*

Cochinchine : Duong-dang, île de Phu-quoc, n<sup>o</sup> 27.279 POILANE ; route colon. 20, km. 58, prov. de Bien-hoa, n<sup>o</sup> 19.726 POILANE.

Cette espèce appartient certainement au s. g. *Nigro-hirsuti* de Kraenzlin in Pflanzenreich, mais ne peut être rapporté à aucune espèce de cet ouvrage. Elle est remarquable : 1<sup>o</sup> par sa pilosité (tiges, feuilles, bractées, sépales, pétales, ovaire) ; 2<sup>o</sup> par son ovaire sans pédicelle au temps de la maturité de la capsule ; 3<sup>o</sup> par ses inflorescences insérées vers le sommet des tiges feuillées.

#### ***Dendrobium Simondii* Gagnep., n. sp.**

*Caules pseudo-bulbosi, basi tumiduli, cespitosi, sursum attenuati, 10-30 cm. longi, articulis 1 cm. longis compositi. Folia saepe 3, sessilia, oblongo-linearia, basi attenuata, apice obtuso, oblique emarginato, 6-7 cm. longa, supra medium 15 mm. lata. Inflorescentia terminalis, multiflora (8-15), laxa, 8-12 cm. longa, floribus 5-20 mm. remotis, albo-viridibus, 20-22 mm. latis, pedicellis florem aequantibus, bracteis... — Sepalum dorsale ovato-acutum 14-15 mm. longum, 4-5 latum; sep. lateralia, falciformia acuta, ima basi coalita saccum brevem efformantia. Petala 2, spathulata, acutiuscula, 15-17 mm. longa. Labellum basi canaliculatum attenuatumque, ad mentum articulatum; lobi 3; laterales erecti, obtusi, columnam cingentes, violaceo puncticulati; lobus terminalis, triangulus, margine dentato-crispus, apice rotundus, crassiusculus; discus 3-cristatus, viridis. Gynostemum breve latum, basi in mento productum; anthera viridis, violaceo puncticulata, operculo galeato postice brevi; pollinia 4, per paria coalita. Stigma amphoram figurans.*

Cochinchine : mont de Tai-ninh; aquarelle n<sup>o</sup> 115, description d'après les notes et dessins du récolteur, D<sup>r</sup> SIMOND.

Cette espèce, parfaitement illustrée dans la pl. 115, décrite et analysée en détail par le D<sup>r</sup> SIMOND certainement n'est pas signalée dans la Fl. gén. d'Indo-Chine ni dans la monographie du genre *Dendrobium* 1910, in Pflanzenreich. Elle appartiendrait au sous-genre *Pedilonum* de Kraenzlin.

**Dendrobium subsessile** Gagnep., n. sp.

Herba epiphytica vel rupicola ; rhizoma repens. Pseudo-bulbi cylindraceo-conoidei, 4 cm. longi, nudi, apice bifoliati. Folia lanceolata vel oblonga, petiolata, petiolo 3-4 cm. longo, basi gradatim attenuata, apice acuminata, acutissima, 7-nerva, lamina usque 20 cm. longa, 4 lata. Inflorescentia terminalis, anguste racemosa, 8-10 cm. longa, basi arcte bracteosa, paucimultiflora, bracteis infimis 3-4 appressis, congestis, vaginiformibus, acutis, florentibus perbrevis, ovario subsessile, floribus albidis, 8 mm. longis. — Sepalum dorsale elongatum, obtusiusculum, 8 mm. longum, 2.15 latum, 7-nervum ; sep. lateralia falcata, 8 mm. longa, basi 4 lata, 4-nerva. Petala lineari-oblonga sepalo dorsali similia, 9 mm. longa, 2.3 lata, obtusiuscula, 3-nerva. Labellum ambitu obovatum, trilobum, 9 mm. longum, 6 latum, gradatim in unguem angustatum, lobis lateralibus ovatis brevioribus, lobo intermedio 2 mm. longo elliptico crassiusculo biserialim corrugato ; discus sculptus : lamellis prominentibus 3, ab ungue usque ad lobum intermedium excurrentibus, carunculis 4 infra basin lobo intermedio per paria sejunctis. Gynostemum 4 mm. circiter longum, basi in mentum 4 mm. longum productum ; operculo convexo haud galeato, antheram simulante, bilocellato.

Annam : Nui-Pai-ding, près de Dak-gley, prov. Kontum, n° 32.810 POILANE ; massif du Braïan, près de Djiring, prov. Haut-Donnai, n° 24.142 POILANE.

Par la classification du Pflanzenr. par KRAENZLIN, cette espèce appartiendrait au s. g. *Bolbodium*, section *Diphylla*, et se placerait auprès du *D. Schneiderae* qui est bien différent et australien. Les bractées de la base de l'inflorescence pourraient la faire placer dans le genre *Pholidota*, mais la forme de son anthère est celle d'un *Dendrobium*.

**Dendrobium vagans** Gagnep., n. sp.

Caules cylindracei, articulis multis, 55 cm. longi, usque 1 cm. crassi, vaginis 2 cm. longis. Folia lanceolata, basi obtusa, apice acuminata, bilobulata, vel acuminato-mucronata, 8 cm. longa, 2.5-3 lata, nervoso-striata. Inflorescentia racemosa 7-10-flora 7-8 cm. longa, bracteis ovatis, obtusis, 2 mm. longis ; pedicellis cum ovario circiter 3 cm. longis ; floribus vix 5 cm. diam., luteo-aurantiacis, labello purpureo-maculato. — Sepalum dorsale, oblongum obovatum, obtusum, 2 cm. longum, 7 mm. supra medium latum ; sep. lateralia eo subsimilia, 2 cm. longa, 6 mm. lata, ima basi coalita, mentum brevem, obtusum, 3 mm. longum efformantia. Petala obovata, obtusissima, 22 mm. longa, 10 lata, basi angusta. Labellum orbiculare, 17 mm. longum latumque elobatum, margine crenulato-fimbriatum, supra villosum, basi breviter (2 mm.) unguiculatum convolutumque. Gynostemum 3 mm. altum, apice 3-lobulatum, operculo galeato, basi in mentum brevem productum.

Annam : Braïan, près Djiring, 1.000-1.200 m. alt., prov. Haut-Donnai, n° 24.780 POILANE.

Cette espèce est remarquable : 1° par ses fleurs sur des tiges

feuillées ; 2<sup>o</sup> par ses grappes à 7-10 fleurs ; 3<sup>o</sup> par ses pétales plus larges que les sépales ; 4<sup>o</sup> par son labelle orbiculaire, sans lobes marqués, courtement velu-frangé au bord ; 5<sup>o</sup> par ses fleurs moyennes, 5 cm. à peine de diam. étant étalées. Je n'ai pu la situer en toute certitude dans aucun des s.-g. donnés par KRAENZLIN dans la monographie du Pflanzenr.

**Desmotrichum forcipatum** Gagnep., n. sp.

*Caules* 12-25 cm. longi, basi filiformes, pseudo-bulbos gerentes ; pseudo-bulbi clavati, 2-3 cm. longi, straminei sessiles, laterales, alternantes, apice 1-foliati. *Folia* oblongo-linearia, solitaria, sessilia, basi attenuata, apice acuminata, bilobulataque, 6 cm. longa, 8 mm. lata, nervoso-striata, supra convexa. *Inflorescentia* terminalis, floribus succedaneis, saepe 2 coetaneis, circiter 10 mm. longis, ochroleucis, labello ad medium purpureo maculato, pedicello vix 5 mm. longo. — *Sepalum* dorsale ovato-obtusum, 4 mm. longum ; sep. lateralia 1 cm. longa, basi 3 lata, longe ad mentum 7 mm. coalita. *Petala* ovato-oblonga sepalum dorsalem aequantia, dimidio angustiora. *Labellum* 12 mm. longum longe e angustequa unguiculatum ad medium bilobulatum, lobis ovatis, supra medium bilamellatum, lamellis purpuris, anticae bilobum, lobis falcatis, equitantibus, obtusis. *Gynostemum* breve 2 mm., stelidis bidenticulatis, operculo conoideo.

Annam : Station agricole de Blao, prov. Haut-Donnai, n<sup>o</sup> 22.489 POILANE ; Nui-Bach-ma, près Hué, n<sup>o</sup> 29.943 POILANE, échantillon un peu plus vigoureux.

Bien que le second spécimen soit sans fleur, j'ai cru pouvoir l'assimiler au premier parce que les différences sont simplement individuelles ; de plus le collecteur a décrit les fleurs de l'un et de l'autre et les deux descriptions concordent.

Ce *Desmotrichum* est voisin de *D. convexum* Bl. Il en diffère : 1<sup>o</sup> par les feuilles larges de 8-9 mm. seulement, non convexes sur les deux faces ; 2<sup>o</sup> par la fleur à menton très long, atteignant 4 mm. ; 3<sup>o</sup> par le labelle à lobe moyen en tenaille, bilobulé, les deux lobules falciformes, chevauchant en bec croisé, par les lamelles situées au-dessus des lobes latéraux.

**Bulbophyllum bokorense** Gagnep., n. sp.

*Herba* usque 70 cm. alta. *Pseudo-bulbi* approximati vel contigui fusiformes, carnosii, violacei, primum fibrosi deinde nudi 4-5 cm. longi. *Caulis* elongatus, violaceus, vaginatus, vaginis albidis, fibrosis. — *Folia* alterna sessilia, amplexicaudia, lanceolata 10 cm. longa, 4 lata, ad tertiam partem caulis 10 circiter occupantia ; nervi conspicui. *Inflorescentia* scaposa, aphylla, caulibus foliosis aequilonga, basi subviolacea, vaginata, apice racemosa, multiflora, floribus 15-20, basalibus primum expansis, viridi-luteis purpureo maculatis pedicello filiformi, 2 cm. longo, bractea lanceolato-acuminata 15-8 mm. longa. — *Sepala* 3, subsimilia lanceolata, acuta, 15 mm. longa, 4-5 lata, 5-nervata. *Petala* linearia, 13-14 mm. longa, 2 lata, 3-nervata.

*Labellum albo-viride, deinde luteum, 10 mm. longum, ad apicem 10 mm. latum, trilobum, late obtusatum, lobis 3, lateralibus triangulis, falciformibus, patentibus, 4 mm. extensis, lobo terminali subnullo, triangulo-obtuso, 1 mm. longo, reflexo. Columna 4 mm. longa, antice concava, 2.5 mm. lata; staminis operculum ovato-triangulum supra convexum infra biloculare, pollinibus 4, per paria in quaque loculo, obovatis, compressis.*

Cambodge : Bokor, sous-bois dense, dans des amas de feuilles mortes décomposées ; floraison : mai-juin. (M<sup>me</sup> PORÉE-MASPERO).

Le récolteur a donné de ce *Bulbophyllum* une description faite sur le vif, un bon croquis d'ensemble et enfin une grappe entière de fleurs qui a permis de préciser les caractères floraux importants.

### ***Bulbophyllum cochinchinense* Gagnep., n. sp.**

*Epiphyticum. Rhizoma longe repens, fibrosum, pseudo-bulbis oblongis, approximatis, 3 cm. longis, 8-10 mm. crassis, apice monophyllis. Folia oblonga, basi in petiolum gradatim angusta 12-22 cm. longa, supra medium 3-4 cm. lata, obtusa, firma, in sicco nervoso-striata. Inflorescentia 1-flora, pedunculo dense bracteoso, pedicello, cum ovario, 3 cm. longo, flore viridiluteo, purpureo-maculato, explicato 4 cm. diam. — Sepalum dorsale lanceolatum, acuminatum 25 mm. longum, 8 latum, multinervum; sep. lateralia falcata, forcipata, 18 mm. longa, 7 lata multinerva, ad mentum 4 mm. longum, basi coalita. Labellum falcatum, unguam tigridem referente, ad apicem menti articulatum, 6 mm. longum. Gynostemum columnare, 6 mm. longum, basi dilatatum, operculo umbonato, antice denticulato.*

Cochinchine : arboretum de Trang-bom, prov. Bien-hoa, n° 23.628 POILANE ; forêt de Samath, nos 106, 111 MULLER.

J'avais rapproché cette espèce des *B. patens* King et *affine* Lindl. avec doute et d'après l'apparence. Après analyse de la fleur, il a fallu l'en séparer.

### ***Bulbophyllum kontumense* Gagnep., n. sp.**

*Rhizoma validum, 4-5 mm. crassum, fibrosum, fibris brevibus, appressis, aliis capillaceis, multoties longioribus; pseudo-bulbi conoidei, 4-5 cm. remoti, 2.5 cm. longi, basi 10-12 mm. crassi, monophylli. Folia oblonga, basi 10-15 mm. petiolata, obtusa, 10 cm. longa, circiter 2 lata, coriacea. Inflorescentiae scapus basi pseudo-bulborum natus, filiformis, subnudus, 12 cm. longus, supra basin 1-vaginat, apice bracteatus, bracteis linearibus, approximatis, 7-10 mm. longis, capitulini dispositis, floribus dilute viridibus, pedicello 2 cm. circiter longo. — Sepalum dorsale oblongum, naviculare, obtusum 6 mm. longum, nervis 5; sep. lateralia falcata, acuta, 10 mm. longa, basi 5 lata, nervis 5, basi ad mentum adnata. Petala late ovata, obtusissima, 5 mm. longa 3.5 lata, nervis 5 excurrentia. Labellum album, ad mentum sursum sepala stipitatum, semi-annulatum, apice incurvum, 4 mm. longum. Gynostemum breve, 3 mm. altum, latere alatum, apice 4-denticulatum, basi in mentum 4 mm. longum productum, operculo convexo 1.5 mm. lato, antico-postice 1 longo.*

Annam : près du village de Dak-gley, prov. Kontum, n<sup>o</sup> 32.925  
POILANE.

À première vue ressemble à *Bulbophyllum leptanthum* Hook. f., mais en diffère : 1<sup>o</sup> par le rhizome plus robuste avec deux sortes de fibres ; 2<sup>o</sup> par le seape deux fois plus long ; 3<sup>o</sup> par les bractées plus longues ; 4<sup>o</sup> par les pétales plus longs et larges en proportion des sépales ; 5<sup>o</sup> par le labelle stipité au-dessus des sépales latéraux.

***Bulbophyllum ombrophilum* Gagnep., n. sp.**

*Epiphytica, ad nodos radicans rhizomate filiformi, 1 mm. diam. repente, pseudo-bulbis remotis, conoideis, 8 mm. longis, monophyllis. Folia solitaria, lineari-oblonga, 9 cm. longa, 8 mm. lata, basi in petiolo brevi subnullo attenuata, apice acuminata brevissime bilobulata, lobulis aequalibus. Inflorescentia ad basin pseudo-bulbi enata scaposa, 7-8 cm. longa, supra medium flores gerens ; bracteis 2-3 sterilibus infra medium sitis, lanceolatis, 4-5 mm. longis, br. fertilibus iis consimilibus approximatis, pedicellis bracteis aequilongis, floribus minutis 7 mm. longis, luteis intus purpureo striatis (fide Poilanei). — Sepalum dorsale triangulo-elongatum 6.5 mm. longum, acuminatum, 3-nervatum ; sep. lateralia 7 mm. longa, acuminata, 3-nervata. Petala elliptica, basi vix unguiculata, obtusa, nervo medio solitari, 3 mm. et ultra longa. Labellum oblongum, recurvum, supra canaliculatum 4 mm. longum, basi 2 mm. stipitatum. Gynostemum conoideum, breve, apice biaristatum, 1.2 mm. longum, operculo convexo 0.6 mm. diam., pollinia 4 per paria coalita.*

Annam : près village de Dak-bon-không, prov. du Kontum, 1.360 m. alt., climat pluvieux, brumeux, humide, n<sup>o</sup> 32.936 POILANE ; massif du Ngok-pau, prov. Kontum, 2.400 m. alt., n<sup>o</sup> 35.822 POILANE.

Ce *Bulbophyllum* est très comparable au *B. reptans* Lindl. Il en diffère : 1<sup>o</sup> par le seape (partie sans fleurs) de l'inflorescence deux fois plus long ; 2<sup>o</sup> par les pseudo-bulbes plus courts ; 3<sup>o</sup> par le labelle jaune, stipité deux fois plus longuement depuis la base du gynostème ; 4<sup>o</sup> par les pétales elliptiques, non oblongs.

***Bulbophyllum Simondii* Gagnep., n. sp.**

*Herba epiphytica protracta, rhizomate elongato, vaginato, ramoso, squamis (vaginis) sat laxis sordide stramineis, pseudo-bulbis ovatis, ± remotis, 2-3 cm. diam., 3-4 sulcatis, monophyllis, supra basin nudis. Folia solitaria, anguste lanceolata vel subelliptica, subsessilia, subobtusa, coriacea, 5-8 cm. longa, 1-2 lata. Inflorescentia pauciflora, pedunculo filiformi 12-15 mm. longo, bibracteato, bracteis alternis, acutis, minutissimis, floribus 3, verticillatis vel subumbellatis, 6-10 mm. diam., albidis, sepalis ad apicem aurantiacis, pedicello sepalis aequante. — Sepala 3 interse sensim aequilonga, similiaque longe acuminata, 10 mm. longa. Petala sepalis 2-plo breviora, ovato-acuminata, subobtusa, albida. Labellum minutum, basi unguiculatum, ascendens, ad columnam appressum eabrevius, albidum. Gynostemum horizontale, basi proectum cum latello articulatum, apice stelidiis 2, acutis*

*antice appendiculatum*; *stamen apicale operculo ovato, cordiformi, biloculare, pollinibus 4, oblongis, per paria coalitis.*

Annam : sans localité indiquée pl. 20 (Simond) avec dessin d'analyse florale et description sur le vif.

L'espèce la plus affine est le *B. protractum* Hook. f. *Icones*, tab. 2.037. La présente en diffère : 1° par les gaines du rhizome un peu plus longues, moins appliquées ; 2° par les pseudo-bulbes plus rapprochés et même contigus ovoïdes ; 3° par les feuilles plus courtes, plus obtuses ; 4° par l'inflorescence à 2-3 fleurs deux fois plus larges ; 5° par les pédicelles de la longueur des sépales, presque 10 mm. ; 6° par les pétales deux fois plus courts que les sépales et plutôt obtus ; 7° par l'opercule de l'étamine largement ovalc, cordé, suborbiculaire dans l'ensemble.

### **Bulbophyllum subbulbum** Gagnep., n. sp.

*Herba epiphytica, 18 cm. alta ; rhizoma brevi, pseudo-bulbis perbrevibus, conglomeratis, 5 mm. attingentibus, monophyllis. Folia petiolata, oblonga, basi gradatim attenuata, apice obtusa, mucronulata, lamina 9-13 cm. longa, 9-15 cm. lata, firma, petiolo 3-4 cm. longo. Inflorescentia ad basin pseudo-bulborum oriens, basi vaginibus imbricatis circa 5 vestita, spiciformis, 9-13 longa, densiflora, spica usque 8 cm. longa, bracteis 7 mm. longis, lineari-acuminatis, pedicellis 1-2 mm. longis, floribus albis minutis, 9 mm. longis. — Sepalum dorsale 6 mm. longum, lineare, valde acuminatum, 1-nervatum ; sep. lateralia, eo simillima, basi latiora, 7 mm. longa, 3-nervata. Petala lanceolato-acuminata, minutissime scabra, 2.8 mm. longa, 0,6 mm. lata. Labellum oblongum, panduratum 3 mm. longum, lobis lateralibus leviter prominentibus, lobo antico ovato, obtuso, minutissime scabro. Gynostemum cum mento aequilongo, 2 mm. longum, apice bispinosum, ad extremitatem menti labellum gerens ; operculo staminis convexo.*

Annam : Station agricole de Blao, prov. Haut-Donnai, n° 22.798  
POILANE.

Ce *Bulbophyllum* a quelque analogie au premier abord avec *B. ebulbum* King et Pantling *Ann. Roy. bot. Gard. Calcutta*, VIII, tab. 115. Il s'en distingue : 1° par ses pseudo-bulbes présents, quoique minuscules ; 2° par ses feuilles deux fois plus réduites ; 3° par les bractées et les pièces du périanthe beaucoup plus acuminées ; 4° par ses fleurs blanches (Poilane) ; 5° par les pétales acuminés ; 6° par le labelle très rétréci en son milieu.

### **Cirrhopetalum spicatum** Gagnep., n. sp.

*Herba rupestris longe rhizomatosa, rhizomate nudo ad nodos radicoso 3 mm. crasso vaginis mox evanescentibus ; pseudo-bulbi 10-13 cm. remoti breviter conoidei 2 cm. alti crassique, angulati, nudi, diphylli. Folia elliptica, basi in petiolo brevi angustata, apice obtusa, emarginata, lobulis brevibus, aequalibus rotundis, usque 4.5 cm. longa, 1-2 lata, coriacea, petiolo 7 mm.*

longo. Inflorescentiae scapus ad basin pseudo-bulbi enatus 25-30 cm. altus, vaginatus, vaginis 5 cm. remotis, mox nudus, 1.5-2 mm. diam. apice florifer; racemus 1-2.5 cm. longus, spiciformis, floribus numerosis, densissimis, bracteis triangulo-cuspidatis, 4 mm. longis imbricatis, pedicello 2 cm. cum ovario longo. — Sepalum dorsale, triangulo-cuspidatum, 1.5 cm. longum, basi 3.5 mm. latum, trinervum; sep. lateralia toto in uno coalita ambitu triangula, 17 mm. et ultra longa, basi 5 mm. lata. Petala elliptica, 4 mm. tantum longa, apice setas 3, capillaceas gerentia, 5-nerva. Labellum obcordatum, antice ellipticum, obtusum, in medio 5-nervum, 5 mm. longum, basi 4 latum. Gynostemum 2 mm. longum, 3.5 latum, basi brevissime in mento productum; antherae operculum convexum, biloculare, pollinis 4 per paria coalitis.

Laos : plateau des Boloven à 6 km. au N. de la station agricole, 1.100-1.200 m. alt., n° 28.649 POILANE.

Espèce très remarquable par son inflorescence en épi très serré hérissé de bractées courtes et raides; la seule probablement qui présente ce caractère. En raison de cette particularité j'ai douté de sa vraie place dans le genre *Cirrhopetalum*; après examen de 3 fleurs, de l'anthere, de l'opercule et des pollinies, le doute disparaît. — Remarque importante : l'espèce est intermédiaire entre les genres *Cirrhopetalum* et *Bulbophyllum*. Elle a les sépales latéraux soudés comme dans le premier et le sépale dorsal très long par rapport aux pétales comme dans le second.

#### ***Cirrhopetalum insulsum* Gagnep., n. sp.**

*Epiphytica, parvula. Pseudo-bulbi subcontigui, subdistichi, ovati, 10 mm. longi, 5-7 crassi. Folia ad apicem pseudo-bulborum enata, solitaria, anguste oblonga, apice obtusiuscula, basi attenuata, 5-12 cm. longa, 11-15 mm. lata, tenuia, infra pallida. Inflorescentia scaposa, scapo filiformi 6-11 cm. longo, bibracteato, bracteis remotis triangulo-acutis 2-3 mm. longis, floribus paucis (3-5) minutissimis, capitato-aggregatis, bracteis linearibus 3-4 mm. longis, pedicellis flore minoribus. — Sepalum dorsale ovato-acuminatum, 5 mm. longum, 2 latum, trinervatum; sep. lateralia 7-8 mm. longa, longe acuminata, ad apicem coalita. Petala ovata, 3 mm. longa, brevissime mucronata. Labellum falcatum vel semi-orbiculatum reflexum, supra canaliculatum, haud explicatum 2 mm. longum, basi appendice columnae stipatum, stipo 1.5 mm. longo. Columna 1.5 mm. longa, operculo antherae convexo.*

Annam : station agricole de Blao, prov. Haut-Donnai, n° 22.794 POILANE.

A rapprocher du *C. touranense* Gagnep., mais à feuilles plus longues, à fleurs beaucoup plus petites et cependant déjà ouvertes. Ces fleurs sont si minuscules que le collecteur n'a pu en préciser la couleur.

(A suivre)